



Varicell[®] Duo

Aesculus hippocastanum 6 DH

+ **associação**

Medicamento Homeopático

APRESENTAÇÃO:

Comprimido orodispersível - *Aesculus hippocastanum* 6 DH, *Hamamelis virginiana* 6 DH, *Pulsatilla* 10 DH, *Acidum fluoricum* 10 DH - embalagem contendo 30 comprimidos.

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO:

Cada comprimido orodispersível contém:

Aesculus hippocastanum 6 DH 0,0075 mL

Hamamelis virginiana 6 DH 0,0075 mL

Pulsatilla 10 DH 0,0075 mL

Acidum fluoricum 10 DH 0,0075 mL

Excipientes q.s.p. 300 mg

Excipiente: lactose monoidratada, amido pré-gelatinizado e estearato de magnésio.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

VARICELL[®] DUO é indicado como auxiliar no tratamento dos sintomas relacionados a varizes e hemorroidas (como sensação de dor, peso, congestão, plenitude, prurido e sensíveis ao toque dos pés, pernas e hemorroidas).

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

VARICELL[®] DUO é indicado como auxiliar no tratamento dos sintomas relacionados a varizes e hemorroidas, cuja ação terapêutica de seus componentes encontra-se comprovada por meio de compêndios homeopáticos oficiais.

VARICELL[®] DUO é um medicamento homeopático que age segundo o princípio da semelhança, ou seja, postula que uma substância capaz de provocar determinadas alterações sintomáticas em pessoas saudáveis, quando passa por processo especial de preparação, será também capaz de curar essas mesmas manifestações nas pessoas doentes. Este medicamento homeopático é preparado conforme os fundamentos da homeopatia e de acordo com as técnicas descritas na Farmacopeia Homeopática Brasileira.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve utilizar VARICELL[®] DUO se tiver hipersensibilidade (alergia) a qualquer um dos componentes da fórmula. Não foram relatadas, até o momento, contraindicações ao uso dos componentes do medicamento VARICELL[®] DUO.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou cirurgião-dentista (categoria “C”).

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Precauções e advertências

Este produto é um Medicamento Homeopático, em conformidade com as diretrizes definidas pela ANVISA. Quando corretamente utilizado, não deve oferecer riscos à saúde. Eventos adversos inesperados, devem ser comunicados ao médico responsável.

Interações medicamentosas

Não são previstas interações com outros medicamentos ou alimentos. Não é recomendada a ingestão de VARICELL[®] DUO junto com as refeições. Deve ser ingerido, preferencialmente, meia hora antes ou após as refeições.

Não foram relatados, até o momento, efeitos secundários conhecidos com os componentes de VARICELL[®] DUO. Caso suspeite de algum efeito colateral após ingerir VARICELL[®] DUO, por favor, informe ao seu médico ou farmacêutico.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao seu prescritor se estiver amamentando.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação do médico ou cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Este medicamento contém LACTOSE.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Cuidados de conservação

VARICELL[®] DUO deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) em sua embalagem original. Proteger da umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.

Característica física

Os comprimidos de VARICELL[®] DUO são redondos e de coloração branca a levemente amarelada.

Característica organoléptica

Os comprimidos de VARICELL[®] DUO são sem odor.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Modo de usar

Este medicamento se apresenta na forma de comprimido orodispersível, que se desintegra ou se dissolve rapidamente quando colocado sobre a língua, sem a necessidade ingestão de água. É importante deixar o comprimido dissolver sobre a língua. Não mastigar ou engolir por inteiro. Não é recomendada a ingestão de VARICELL[®] DUO junto com as refeições. Deve ser ingerido, preferencialmente, meia hora antes das principais refeições.

A dose recomendada e a duração do tratamento devem ser indicadas pelo seu médico, pois estas dependem da resposta individual de cada paciente ao tratamento. Porém, é geralmente recomendada a manutenção do tratamento até a melhora completa dos sintomas. Segue esquema posológico de uso adulto sugerido como referência.

Posologia sugerida

- Para hemorroidas: 1 comprimido, 2 vezes ao dia, por via oral.
- Para varizes: 1 comprimido ao dia, por via oral. Recomenda-se manter a posologia mínima de 1 comprimido ao dia, por via oral, até a melhora completa dos sintomas.

Não é necessário acordar à noite para tomar o medicamento homeopático.

Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido neste folheto de orientação ao consumidor. Não desaparecendo os sintomas em até 90 dias, consulte um profissional de saúde.

No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.





Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Nenhum efeito prejudicial deve ser esperado se você interromper pontualmente a administração de VARICELL® DUO.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

Você pode fazer a dose recomendada deste medicamento assim que se lembrar. Não exceder a dose recomendada para cada dia.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Não são relatados e conhecidos males e limitações de uso dos medicamentos homeopáticos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação do médico ou do cirurgião-dentista. Não foram realizados estudos em animais ou em mulheres grávidas.



Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu Serviço de Atendimento.

Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

A melhor conduta em uma situação destas é a de esperar e observar. Aumente a ingestão de líquidos. Caso ocorram vômitos, enjoos ou qualquer outro sintoma perceptível procure uma ajuda emergencial médica. **Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.**

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.



DIZERES LEGAIS

Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 721, de 1º de julho de 2022.

Farm. Resp.:
Dra. Marcia Weiss I. Campos
CRF - RJ nº 4499



Notificado por:
FARMOQUÍMICA S/A
Rua Viúva Cláudio, 300, Jacaré
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20970-032
CNPJ: 33.349.473/0003-10
Indústria brasileira

0800 025 0110
sac@farm.com.br

5000742/23-00
BU AB 180x50mm
PH 65704
AR011122

