



Varicell[®] Proct

Aesculus hippocastanum 4 DH +
Acidum fluoricum 10 DH + *Pulsatilla*
10 DH + *Hamamelis virginiana* 4 DH

Medicamento Homeopático

APRESENTAÇÃO:

Pomada - *Aesculus hippocastanum* 4 DH
+ *Acidum fluoricum* 10 DH + *Pulsatilla*
10 DH + *Hamamelis virginiana* 4 DH
- embalagem contendo 1 bisnaga de 25
gramas + 6 aplicadores descartáveis.

USO TÓPICO USO ADULTO

COMPOSIÇÃO:

Cada grama contém:
Aesculus hippocastanum 4 DH 0,625 g
Acidum fluoricum 10 DH 0,625 g
Pulsatilla 10 DH 0,625 g
Hamamelis virginiana 4 DH 0,625 g
Excipientes q.s.p. 25 g
Excipientes: propilparabeno, lanolina e
petrolato branco.



INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

VARICELL[®] PROCT é indicado como auxiliar no tratamento dos sintomas relacionados a hemorroidas.

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

VARICELL[®] PROCT é indicado como auxiliar no tratamento dos sintomas relacionados a hemorroidas, cuja ação terapêutica de seus componentes encontra-se comprovada por meio de compêndios homeopáticos oficiais.

As formas farmacêuticas homeopáticas de uso externo estão regulamentadas na Farmacopeia Homeopática Brasileira, que são ministradas segundo o princípio da semelhança e/ou da identidade, com fins curativos e/ou preventivos, indicadas na homeopatia para complementar o arsenal terapêutico do clínico, complementando o tratamento interno.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?


Você não deve utilizar **VARICELL[®] PROCT** se tiver hipersensibilidade (alergia) a qualquer um dos componentes da fórmula. Não foram relatadas, até o momento, contra-indicações ao uso dos componentes do medicamento **VARICELL[®] PROCT**.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou cirurgião-dentista (categoria “C”).

Este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Precauções e advertências



Este produto é um Medicamento Homeopático, em conformidade com as diretrizes definidas pela ANVISA. Quando corretamente utilizado, não deve oferecer riscos à saúde. Eventos adversos inesperados, devem ser comunicados ao médico responsável.

Interações medicamentosas

Não são previstas interações com outros medicamentos ou alimentos.

Não foram relatados, até o momento, efeitos secundários conhecidos com os componentes de **VARICELL[®] PROCT**. Caso suspeite de algum efeito colateral após fazer uso de **VARICELL[®] PROCT**, por favor, informe ao seu médico ou farmacêutico.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao seu prescritor se estiver amamentando.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação do médico ou cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?


Cuidados de conservação

VARICELL[®] PROCT deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) em sua embalagem original. Após aberto, válido por 6 meses.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.



Característica física

Pomada viscosa levemente amarelada.

Característica organoléptica

Pomada de odor característico.


Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.


6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Instruções de uso

Informações para abertura do lacre da bisnaga da pomada:



Perfurar o lacre da bisnaga com o lado externo da tampa



Conectar o aplicador à bisnaga girando-o no sentido horário.

Modo de usar e Posologia sugerida

Espalhe pequena quantidade de pomada na região ao redor do ânus e no orifício anal com o dedo. Usar a ponta do dedo para vencer a resistência do esfíncter do ânus. Deve-se aplicar a pomada



três vezes ao dia no local afetado. Se possível, massagear de forma circular a parte lesionada, até que a pomada tenha aderido totalmente à região afetada.

Se for necessário utilizar a pomada no reto, o aplicador deve ser adaptado à bisnaga e então inserido delicadamente no ânus. Uma pequena quantidade de pomada deve ser aplicada no reto espremendo a bisnaga suavemente.

A aplicação da pomada deve ser mantida até que ocorra o desaparecimento da lesão. Mantenha sempre o modo de usar sugerido neste folheto ou sob orientação do seu médico.

As orientações e sugestões sugeridas neste folheto estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias pode envolver risco e devem estar sob responsabilidade do prescritor.

Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido neste folheto de orientação ao consumidor. Não desaparecendo os sintomas em até 90 dias, consulte um profissional de saúde.

No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico.

Informe ao seu médico o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas. Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Nenhum efeito prejudicial deve ser esperado se você interromper pontualmente a administração de VARICELL® PROCT.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima aplicação.

Você pode aplicar a dose recomendada deste medicamento assim que se lembrar. Não exceder a dose recomendada para cada dia.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Não são relatados e conhecidos males e limitações de uso dos medicamentos homeopáticos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação do médico ou do cirurgião-dentista. Não foram realizados estudos em animais ou em mulheres grávidas. Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu Serviço de Atendimento.

Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTA MEDICAMENTO?

A melhor conduta em uma situação destas é a de esperar e observar. Aumente a ingestão de líquidos. Caso ocorram vômitos, enjoos ou qualquer outro sintoma perceptível procure uma ajuda emergencial médica.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.



DIZERES LEGAIS

Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 721, de 1º de julho de 2022.

Farm. Resp.:
Dra. Marcia Weiss I. Campos
CRF - RJ nº 4499

FQM

Notificado por:
FARMOQUÍMICA S/A
Rua Viúva Cláudio, 300, Jacaré
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20970-032
CNPJ: 33.349.473/0003-10
Indústria brasileira

☎ **0800 025 0110**
sac@fqm.com.br

500007428/23-00
BU/AB 150 x 400 mm
PH 65706
AR011122

