

Varicell[®] Proct

Aesculus hippocastanum 4 DH + *Acidum fluoricum* 10 DH + *Pulsatilla* 10 DH + *Hamamelis virginiana* 4 DH

Medicamento Homeopático

APRESENTAÇÃO:

Pomada - *Aesculus hippocastanum* 4 DH + *Acidum fluoricum* 10 DH + *Pulsatilla* 10 DH + *Hamamelis virginiana* 4 DH - embalagem contendo 1 bisnaga de 25 gramas + 6 aplicadores descartáveis.

USO TÓPICO USO ADULTO

COMPOSIÇÃO:

Cada grama contém:
Aesculus hippocastanum 4 DH 0,625 g
Acidum fluoricum 10 DH 0,625 g
Pulsatilla 10 DH 0,625 g
Hamamelis virginiana 4 DH 0,625 g
Excipientes q.s.p. 25 g
Excipientes: propilparabeno, lanolina e petrolato branco.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

VARICELL[®] PROCT é indicado como auxiliar no tratamento dos sintomas relacionados a hemorroidas. A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia. **VARICELL[®] PROCT** é indicado como auxiliar no tratamento dos sintomas relacionados a hemorroidas, cuja ação terapêutica de seus componentes encontra-se comprovada por meio de compêndios homeopáticos oficiais. As formas farmacêuticas homeopáticas de uso externo estão regulamentadas na Farmacopeia Homeopática Brasileira, que são ministradas segundo o princípio da semelhança e/ou da identidade, com fins curativos e/ou preventivos, indicadas na homeopatia para complementar o arsenal terapêutico do clínico, complementando o tratamento interno.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve utilizar **VARICELL[®] PROCT** se tiver hipersensibilidade (alergia) a qualquer um dos componentes da fórmula. Não foram relatadas, até o momento, contraindicações ao uso dos componentes do medicamento **VARICELL[®] PROCT**. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou cirurgião-dentista (categoria “C”). Este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Precauções e advertências

Este produto é um Medicamento Homeopático, em conformidade com as diretrizes definidas pela ANVISA. Quando corretamente utilizado, não deve oferecer riscos à saúde. Eventos adversos inesperados, devem ser comunicados ao médico responsável.

Interações medicamentosas

Não são previstas interações com outros medicamentos ou alimentos.

Não foram relatados, até o momento, efeitos secundários conhecidos com os componentes de **VARICELL[®] PROCT**. Caso suspeite de algum efeito colateral após fazer uso de **VARICELL[®] PROCT**, por favor, informe ao seu médico ou farmacêutico.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao seu prescritor se estiver amamentando. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação do médico ou cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Cuidados de conservação
VARICELL[®] PROCT deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) em sua embalagem original. Após aberto, válido por 6 meses.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.
Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.

Característica física
Pomada viscosa levemente amarelada.

Característica organoléptica
Pomada de odor característico.


Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.


6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Instruções de uso

Informações para abertura do lacre da bisnaga da pomada:



Perfurar o lacre da bisnaga com o lado externo da tampa



Conectar o aplicador à bisnaga girando-o no sentido horário.

Modo de usar e Posologia sugerida
Espalhe pequena quantidade de pomada na região ao redor do ânus e no orifício anal com o dedo. Usar a ponta do dedo para vencer a resistência do esfíncter do ânus. Deve-se aplicar a pomada

REFERÊNCIA DE COR

Preto

CÓDIGO ANTIGO

N/A

CÓDIGO NOVO

500007062/22-00



três vezes ao dia no local afetado. Se possível, massagear de forma circular a parte lesionada, até que a pomada tenha aderido totalmente à região afetada.

Se for necessário utilizar a pomada no reto, o aplicador deve ser adaptado à bisnaga e então inserido delicadamente no ânus. Uma pequena quantidade de pomada deve ser aplicada no reto espremendo a bisnaga suavemente.

A aplicação da pomada deve ser mantida até que ocorra o desaparecimento da lesão. Mantenha sempre o modo de usar sugerido neste folheto ou sob orientação do seu médico.

As orientações e sugestões sugeridas neste folheto estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias pode envolver risco e devem estar sob responsabilidade do prescritor.

Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido neste folheto de orientação ao consumidor. Não desaparecendo os sintomas em até 90 dias, consulte um profissional de saúde.

No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico.

Informe ao seu médico o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas. Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Nenhum efeito prejudicial deve ser esperado se você interromper pontualmente a administração de **VARICELL® PROCT.**

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião dentista.

Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima aplicação.

Você pode aplicar a dose recomendada deste medicamento assim que se lembrar. Não exceder a dose recomendada para cada dia.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Não são relatados e conhecidos males e limitações de uso dos medicamentos homeopáticos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação do médico ou do cirurgião dentista. Não foram realizados estudos em animais ou em mulheres grávidas. Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu Serviço de Atendimento.

Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

A melhor conduta em uma situação destas é a de esperar e observar. Aumente a ingestão de líquidos. Caso ocorram vômitos, enjoos ou qualquer outro sintoma perceptível procure uma ajuda emergencial médica.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações. Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

REFERÊNCIA DE COR	
Preto	
CÓDIGO ANTIGO	N/A
CÓDIGO NOVO	500007062/22-00



DIZERES LEGAIS

Medicamento dinamizado notificado
junto à Anvisa conforme RDC nº
238/2018.

Farm. Resp.:
Dra. Marcia Weiss I. Campos
CRF - RJ nº 4499

FQM

Notificado por:
FARMOQUÍMICA S/A
Rua Viúva Cláudio, 300, Jacaré
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20970-032
CNPJ: 33.349.473/0003-10
Indústria brasileira

 **0800 025 0110**
sac@fam.com.br

